

Facteurs associés à l'usage du préservatif parmi les adolescents en divers pays d'Amérique Latine

**Catherine Menkes¹,
Leticia Suárez²**

Introduction

La hausse de la grossesse à l'adolescence dans plusieurs pays d'Amérique Latine, ainsi que des maladies sexuellement transmissibles impliquent la nécessité de réaliser des politiques spécifiques pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes.

L'Amérique Latine a subi pendant les dernières années une transition démographique dont l'intensité et le calendrier est différent selon les divers pays (Chackiel, 2004); Pendant qu'à Honduras et Haïti les niveaux de fécondité sont classifiés comme moyen-haut avec un taux global de fécondité de 4.4 enfants par femme, en Colombie la fécondité est moyenne-basse (2.8 enfants par femme) (Schkolnik et Chackiel, 2004), et pour le Mexique aussi celle-ci est basse (2.1 enfants par femme) (CONAPO, 2007). On peut dire aussi que les facteurs associés à l'usage des méthodes de contraception varient dans chaque pays.

De même, Il faut signaler, qu'il existe un comportement sexuel hétérogène selon le contexte. Le pourcentage d'adolescents sexuellement actifs entre les 15 et les 19 ans varie d'après la région du monde. Les adolescents d'Amérique Latine se caractérisent par avoir des rapports sexuels plus tôt que ceux qui habitent d'autres régions en voie de développement tel que l'Asie, mais plus tard que ceux qui habitent l'Afrique. L'Enquête Nationale de Santé Reproductive (ENSA 2000) nous montre que dans l'Amérique Latine, les adolescents mexicains se trouvent parmi les

¹ Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, México.

² Dirección de Salud Reproductiva, Instituto Nacional de Salud Pública, México.

pays qui ont une proportion plus petite de jeunes actifs sexuellement, surtout en ce qui concerne les femmes (Gayet, Juárez, Magis, Pedrosa, 2003).

D'autre part, les chiffres indiquent sans aucun doute, un emploi limité des méthodes de contraception lors du premier rapport sexuel des adolescents dans la plupart des pays d'Amérique Latine.

L'objectif de cette recherche est d'analyser les facteurs qui déterminent l'emploi du préservatif au premier rapport sexuel des adolescentes, dans divers pays d'Amérique Latine qui se trouvent en différentes phases de la transition démographique.

Méthodologie

Pour Haïti (2005/2006), pour Honduras (2005) et pour la Colombie (2005) on a utilisé et analysé l'information disponible de la *Démographique and Health Surveys (DHS)* des cinq dernières années et on l'a comparé avec l'Enquête Nationale de Santé Reproductive 2003 (ENSAR 2003) réalisé au Mexique.

Les principales caractéristiques socioéconomiques et démographiques analysés des adolescentes de 15 à 19 ans sont: niveau socioéconomique, lieu de résidence, scolarité, âge de la femme et de son partenaire au moment du premier rapport sexuel et état conjugal.


Pour établir les facteurs qui déterminent l'utilisation du préservatif masculin au premier rapport sexuel on effectue des modèles de régression logistique multi variés pour chaque pays, en prenant comme variable dépendante l'emploi ou non-emploi du préservatif masculin³ et comme variables indépendantes les caractéristiques socio-économiques et démographiques déjà mentionnés.

Résultats

Les chiffres montrent que dans la plupart des pays analysés, près d'un tiers des adolescentes ont déjà eu leur premier rapport sexuel. Dans le cas d'Haïti on observe le plus haut pourcentage de filles initiées sexuellement, tandis que pour le Mexique le plus bas, vu qu'uniquement 26% des adolescentes s'étaient déjà initiées (graphique 1). La lecture à propos de ce sujet, montre que les rôles de genre, et les tabous sexuels peuvent mener plusieurs jeunes à ne pas s'initier sexuellement, même si elles le désirent, par crainte de mettre en risque leur réputation ou par peur de ne pas


³ On analyse uniquement l'usage du préservatif masculine, car c'est l'unique méthode de contraception utilisée en Amérique Latine qui protège des maladies sexuelles de transmission ainsi que de la grossesse. Le préservatif féminin n'est pratiquement pas connu dans la région.

répondre aux attentes de la société. Ces mêmes facteurs peuvent aussi conduire à une sous-estimation de l'activité sexuelle parmi certaines adolescentes qui préfèrent ne pas reconnaître dans les enquêtes qu'elles se sont déjà initiées sexuellement. Dans certains pays comme le Mexique, les rôles de genre et la morale sexuelle, influent de manière significative dans les décisions qui sont en rapport avec l'initiation sexuelle (Menkes 2006).



En ce qui concerne la protection sexuelle, on observe une utilisation du préservatif assez réduite: 38.3% pour la Colombie; 22.4% pour le Haïti et 10.6% pour Honduras et 25.5% pour le Mexique (2005) (Graphique 2).

Graphique 2
Adolescentes de 15 à 19 ans qui ont utilisé le préservatif masculin au premier rapport sexuel (Pourcentage)



Les études de santé sexuelle et reproductive des adolescentes en Amérique Latine, ont démontré qu'une partie importante d'entre elles, qui ont eu son premier rapport sexuel, appartiennent aux secteurs économiques moins privilégiés et qu'elles sont mariées ou liés conjugalement, bien que les résultats varient selon les différents pays. Pendant qu'en Colombie et au Mexique, les trois quarts habitent les zones urbaines, en Haïti, seulement la moitié et à Honduras 39%. Les mêmes résultats s'appliquent au sujet du niveau de scolarité, car pendant que 77.4% en Colombie et 65.7% au Mexique ont fini l'école secondaire ou un peu plus, seulement 42.2% à Haïti et 28.5% à Honduras l'ont accomplie. L'âge du premier rapport sexuel varie selon le pays et dans le cas du Mexique et d'Honduras, il se donne plus tard qu'en Colombie et Haïti. Probablement, ces différences s'expliquent car dans le cas des deux derniers pays la plupart des adolescentes qui ont eu leur premier rapport sexuel sont célibataires, pendant qu'au Mexique et à Honduras la plupart d'entre elles sont unies. Finalement on

observe que les partenaires sont plus âgés en Colombie et à Haïti (Tableau 1).

Quand à la protection sexuelle au premier rapport sexuel, il est clair que l'usage des méthodes anticoncéptives augmente si le foyer appartient à un foyer avec un niveau de revenu moins bas, dans les zones urbaines, chez les femmes avec plus de scolarité et chez les célibataires. L'usage de méthodes augmente aussi en Colombie, Haïti et Honduras selon augmente l'âge de l'adolescente. Par contre, l'usage ne présente pas une tendance claire selon l'âge du partenaire dans aucun pays (Tableau 2).

Tableau 1
Caractéristiques générales des femmes de 15 à 19 ans ayant déjà eu un premier
rapport sexuel en quelques pays d'Amérique Latine

Caractéristiques	Pays			
	Colombie	Haïti	Honduras	Mexique
Résidence				
Rural	24.0%	46.3%	61.0%	24.0%
Urbain	76.0%	53.7%	39.0%	76.0%
Scolarité				
Moins de secondaire	22.6%	57.8%	71.5%	34.3%
Secondaire ou plus	77.4%	42.2%	28.5%	65.7%
Âge au premier rapport sexuel				
Jusqu'à 13 ans	13.4%	17.7%	3.5%	5.0%
14 ans	19.4%	22.4%	7.6%	13.5%
15 ans	25.8%	23.4%	19.7%	25.6%
16 ans	21.0%	19.2%	27.0%	24.8%
17 ans	13.8%	12.3%	20.5%	16.8%
18 à 19 ans	6.5%	5.0%	21.7%	14.4%
Etat conjugal				
Unie ou mariée	40.2%	48.1%	76.9%	65.1%
Célibataire	59.8%	51.9%	23.1%	34.9%
Âge du premier compagnon				
10 à 19 ans	50.9%	57.4%	43.1%	53.3%
20 à 24 ans	35.1%	35.3%	39.5%	34.9%
25 ans ou plus	14.0%	7.3%	17.4%	11.8%

Source: Pour Mexique: Enquête Nationale de la Santé reproductive, 2003

Pour les autres pays: Demographic Health Surveys (DHS)

Tableau 2
Caractéristiques sociodémographiques des adolescentes selon l'utilisation du
préservatif masculin en quelques pays d'Amérique Latine

Caractéristiques	Pays			
	Colombie	Haïti	Honduras	Mexique
Niveau socio-économique				
Bas	27.0%	10.6%	5.3%	20.8%
Moyen	41.9%	20.7%	11.6%	42.7%
Haut	45.8%	26.8%	16.9%	56.1%
Résidence				
Rural	26.5%	16.3%	7.3%	5.9%
Urbain	40.7%	26.0%	14.9%	31.8%
Scolarité				
Moins de secondaire	24.2%	16.0%	6.6%	9.3%
Secondaire ou plus	41.0%	28.2%	21.2%	34.0%
Âge au premier rapport sexuel				
Moins de 15 ans	33.6%	20.0%	8.7%	32.0%
15 à 16 ans	39.0%	21.9%	11.4%	25.0%
17 à 19 ans	46.4%	31.6%	14.9%	22.5%
Etat conjugal				
Unie ou mariée	22.8%	16.6%	8.0%	17.5%
Célibataire	46.0%	25.6%	22.2%	42.4%
Âge du premier compagnon				
10 à 14 ans	13.5%	21.2%	4.0%	0.0%
15 à 19 ans	39.2%	24.4%	14.4%	33.0%
20 à 29 ans	38.0%	20.3%	9.3%	17.4%
30 ans ou plus	23.8%	1.6%	5.2%	18.7%

Source: Pour Mexique: Enquête Nationale de la Santé reproductive, 2003

Pour les autres pays: Demographic Health Surveys (DHS)

Les facteurs associés avec l'usage du préservatif masculin au premier rapport sexuel sont différents dans chaque pays selon le modèle de régression logistique ; l'utilisation augmente (Tableau 3) :

- Chez les adolescentes qui appartiennent aux secteurs plus favorisés du Mexique et pour Haïti ceux qui appartiennent aux couches sociales: moyenne et haute.**
- Chez les adolescentes qui habitent les régions urbaines du Mexique ainsi que de Colombie.**
- Chez celles qui appartiennent à l'école secondaire en Colombie, Honduras et au Mexique.**
- Chez les adolescentes qui sont Célibataires en Colombie, Honduras et au Mexique.**
- Chez celles qui commencent leur vie sexuelle tardivement en Colombie et Haïti.**

Enfin, l'âge du partenaire sexuel augmente l'utilisation du préservatif masculin au premier rapport sexuel dans les couples plus âgés en Colombie et dans ceux un peu moins âgés d'Honduras.

Il attire notre attention que pendant que l'état conjugal et le niveau de scolarité sont des variables très importantes qui déterminent l'utilisation du préservatif dans presque tous les pays, à Haïti on n'a pas observé une relation statistiquement significative selon le modèle. Par contre, seulement à Haïti et en Colombie on trouve une relation significative entre l'âge du premier rapport et l'utilisation du préservatif.

Tableau 3
Facteurs associés à l'utilisation du préservatif au premier rapport sexuel (regression logistique)

Caractéristiques	Colombie, 2005		Haïti, 2005/06		Honduras, 2005		Mexique, 2003	
	OR	p	OR	p	OR	p	OR	p
Niveau socio-économique								
Bas	1.00		1.00		1.00		1.00	
Moyen	1.19	0.140	1.78	0.026	1.62	0.082	1.59	0.100
Haut	1.19	0.087	1.95	0.015	1.62	0.111	1.93	0.050
Résidence								
Rural	1.00		1.00		1.00		1.00	
Urbain	1.25	0.034	1.43	0.099	1.31	0.248	2.60	0.002
Escolarité								
Moins de secondaire	1.00		1.00		1.00		1.00	
Secondaire ou plus	1.64	0.000	1.20	0.296	2.67	0.000	2.55	0.000
Âge au premier rapport sexuel	1.07	0.012	1.18	0.006	1.05	0.467	1.04	0.734
Etat conjugal								
Unie ou mariée	1.00		1.00		1.00		1.00	
Célibataire	2.19	0.000	1.16	0.383	2.20	0.000	3.40	0.000
Âge du premier compagon sexuel								
10 à 19 ans	1.00		1.00		1.00		1.00	
20 à 24 ans	0.98	0.817	0.76	0.135	0.64	0.036	1.04	0.908
25 ans ou plus	0.77	0.030	0.69	0.271	0.77	0.345	0.70	0.316

OR= Odds Ratio

Source: Pour Mexique: Enquete Nationale de la Santé reproductive, 2003

Pour les autres pays: Demographic Health Surveys (DHS)

Conclusions

Bien que la protection sexuelle lors du premier rapport est très réduite chez les adolescentes dans tout les pays considérés d'Amérique Latine, les pratiques sexuelles et les facteurs sociodémographiques associées avec l'usage du préservatif, ne sont pas les mêmes dans les pays étudiés. Ils varient aussi parmi ceux qui se trouvent dans la même phase de la transition démographique. Donc, les politiques régionales de la population doivent considérer ces différences afin d'améliorer la santé sexuelle et reproductive de la population adolescente.

Références

Chackiel Juan. «La transition démographique de la fécondité en Amérique Latine 1950-2000», *Papiers de Population*, 2004, juillet-septembre, numéro 041, pp.9-58.

Chávez A. Uribe P. Palma Y. (Coords.), *La santé reproductive en Méxqueo: Analyse de l' Enquete Nationale de Santé Reproductive 2003*, Secretaría de Salud y Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexique.

CONAPO. Auge d'indicateurs démographiques 2000-2030, Mexique, 2007.

DHS. Colombia: DHS, 2005. Measure DHS, 2005.

DHS. Haiti: DHS 2005/06. Measure DHS, 2007.

DHS. Honduras: DHS 2005. DHS, Measure 2006.

Gayet Cecilia, Juárez Fátima, Magis Carlos, Pedrosa Laura. «Utilisation du préservatif parmi les adolescents mexicains pour la prévention des infections de transmission sexuelle», *Santé Publique du Mexique*, 2003, Vol.45, num. 5, pp. 632-40

Menkes Catherine « Inéquité de genre, moral sexuelle, et pratiques sexuelles des adolescents au Mexique » communication présentée au Séminaire International des transitions à la vie adulte des adolescentes des pays en développement IUSSP, CEDUA, UNFPA, Cholula, Puebla, 2006.

Schkolnik Susana, Chackiel Juan. «Les secteurs qui trainent dans la transition de la fécondité en Amérique Latine», *Chronique de la CEPAL* 83, 2004. Août, pp. 13-31.