

Facteurs contextuels de la sexualité à haut risque dans l'adolescence au Burkina Faso

Résumé court

Ces dernières décennies, les recherches sur le comportement sexuel des adolescents portent essentiellement sur les sept (7) indicateurs définis par l'ONUSIDA pour l'évaluation des programmes nationaux de lutte contre le sida. Pour ces recherches, l'un ou l'autre des sept indicateurs suffisaient à définir le risque sexuel encouru par l'adolescent. Parallèlement, des débats se sont fait jour sur la notion de risque de sexualité dans l'adolescence et sur la pertinence de considérer certains indicateurs indépendamment des autres. De tels débats militent pour une redéfinition de la notion de risque de sexualité et une révision des modes de détermination des indicateurs. L'objectif de la présente recherche est d'identifier les facteurs individuels, familiaux et communautaires du comportement sexuel à haut risque dans l'adolescence. La recherche se démarque des travaux précédents sur le comportement sexuel par une définition qui tient compte du cumul des risques sexuels de l'adolescent.

Résumé long

Ces dernières décennies, les recherches sur le comportement sexuel des adolescents portent essentiellement sur les sept (7) indicateurs définis par l'ONUSIDA pour l'évaluation des programmes nationaux de lutte contre le sida. Pour ces recherches, l'un ou l'autre des sept indicateurs suffisaient à définir le risque sexuel encouru par l'adolescent. Parallèlement, des débats se sont fait jour sur la notion de risque de sexualité dans l'adolescence et sur la pertinence de considérer certains indicateurs indépendamment des autres. Par exemple, dans le domaine de la lutte contre le sida, il est argué que l'entrée en sexualité dans l'adolescence ne constituerait pas un risque en soi si les partenaires se sont servis du condom. De tels débats militent pour une redéfinition de la notion de risque de sexualité et une révision des modes de détermination des indicateurs dans les recherches. Cela conduit directement à la notion de gradation des risques sexuels pour les adolescents. Ainsi, l'entrée en sexualité constitue un risque de santé s'il s'est produit plus précocement, mais le niveau de risque devient plus élevé si le condom n'a pas été utilisé.

L'objectif de la présente recherche est d'identifier les facteurs individuels, familiaux et communautaires du comportement sexuel à haut risque dans l'adolescence. La recherche se démarque des travaux précédents sur le comportement sexuel par une définition qui tient compte du cumul des risques sexuels de l'adolescent. Il s'agira de construire un indice de comportement sexuel sur la base de quatre indicateurs de comportement sexuel : des indicateurs de l'entrée en sexualité (âge au premier rapport sexuel et utilisation du condom au premier rapport sexuel) et des indicateurs des rapports sexuels des 12 derniers mois (partenaires sexuels et utilisation du condom). Un adolescent est défini à haut risque de comportement sexuel s'il cumule au moins 3 risques sexuels dans son histoire sexuelle.

Pour la recherche des déterminants du comportement sexuel, l'étude s'inscrit dans une approche écologique qui est plus englobant et qui tient compte de

l'adolescent puis de ses interactions avec son environnement social immédiat et élargi.


L'Enquête nationale sur les adolescents (ENA) du Burkina Faso de 2004 fournit les données pour l'opérationnalisation de l'étude. Elle porte sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents de 12 à 19 ans. C'est une enquête organisée par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), en collaboration avec Macro International Inc., l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) et The Alan Guttmacher Institute (Guiella et Woog, 2006). Au total 5 955 adolescents, dont 49,4% de filles et 50,6% de garçons, ont été enquêtés dans des ménages. Pour la présente étude, l'échantillon sera limité aux adolescents entrés en sexualité hors union et qui ne vivent pas dans une union, au moment de l'enquête.

L'exploration de l'histoire sexuelle des 934 adolescents de l'échantillon d'analyse, présentée sur le schéma 1, donne un aperçu des niveaux de risque sexuel auxquels ils ont été exposés. Dans la définition de l'entrée en sexualité, toute entrée en sexualité intervenue à moins de 16 ans est considérée précoce. On constate que la majorité des adolescents (83,6%) a pris au moins un risque dans la vie sexuelle. On retient surtout qu'ils sont 40,5% à avoir cumulé au moins 3 risques sexuels. Il s'agit pour la plupart des adolescents qui sont entrés en sexualité à moins de 16 ans et qui se sont illustrés par la non utilisation du condom et le multipartenariat sexuel. D'autres ont expérimenté la sexualité à des âges plus mûres mais ne recourent pas au condom et/ou multiplient les partenaires sexuels.

Tableau 1 : Risques cumulés de la sexualité dans l'adolescence au Burkina Faso

Risques sexuels cumulés	Adolescents	
	Effectifs	Pourcentages
Sans risque	153	16,4
Un risque	181	19,4
Deux risques	222	23,8
Au moins 3 risques	378	40,5
Total	934	100,0

Schéma 1 : Histoire sexuelle des adolescents burkinabè



Légende

- Un risque de sexualité
- Deux risques de sexualité
- Trois risques de sexualité
- Quatre risques de sexualité